

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# 手指消毒用速乾性アルコールジェル サニサーラW<sup>®</sup>

第3類医薬品

エタノールを有効成分とする手指消毒剤です。

手に取ったとき手のひらからこぼれにくく、保湿成分を配合した低粘度のジェル剤です。

## ⚠ 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

#### 次の部位には使用しないこと

- (1) 損傷のある皮ふ。
- (2) 目の周囲、粘膜等。



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 取扱う場合、換気を十分行うこと。
- (5) 火気に近づけないこと。
- \* (6) 使用期限が過ぎた製品は、使用しないこと。
- \* (7) 本剤はアルコールを含有しているため、床などの塗装面や衣服などについたりすると変色する場合がありますので注意すること。
- \* (8) ノズルの先が詰まる場合には、詰まりを取り除いてから使用すること。



### 火気厳禁

危険物第4類  
アルコール類(エタノール)  
引火性 水溶性・危険等級Ⅰ

### 【お問い合わせ先】

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店 又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

サラヤ株式会社 学術部

TEL. 06-4706-3938

\*受付時間 9:00~18:00 (土、日、祝日を除く)

### 【効能又は効果】 手指・皮ふの消毒

\*【用法及び用量】 適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込む。

#### 〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないよう、注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。
- (4) 血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、水分を除去してから使用すること。

### 【成分及び分量】

サニサーラWは、有効成分としてエタノール(C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O)76.9~81.4vol%、添加物として、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アジピン酸ジイソブチル、トリエタノールアミン、カルボキシビニルポリマー、ヒプロメロースを含有する。