

日本薬局方 第3類医薬品

# 消毒用エタノール

(販売名) 消毒用エタノール (サラヤ)

(記載要領変更に伴う改訂)

**手指・皮膚の殺菌・消毒  
にお使いください。**

## 性状

本品は無色透明の液である。  
本品は水と混和する。  
本品は点火するとき、淡青色の炎をあげて燃える。  
本品は揮発性である。

このボトルは、使用后、両手で簡単に折りたたむことができ、ゴミの減容化に役立ちます。



**火気厳禁**

引火性

危険物第4類 アルコール類(エタノール)  
水溶性・危険等級II

サラヤ株式会社  
大阪市東住吉区湯里 2-2-8

日本薬局方 第3類医薬品

# 消毒用エタノール

(販売名) 消毒用エタノール (サラヤ)

ご使用に際して、このラベルの説明をよくお読みください。

## 使用上の注意



**してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

**次の部位には使用しないこと**

- (1) 損傷のある皮膚。
- (2) 目の周囲、粘膜等。



**相談すること**

**1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

**2. 使用后、次の症状があらわれた場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

日本薬局方 第3類医薬品

# 消毒用エタノール

(販売名) 消毒用エタノール (サラヤ)

**【効能又は効果】** 手指・皮膚の殺菌・消毒

**【用法及び用量】** 本品をそのまま消毒部位に塗布する。

**〈用法及び用量に関連する注意〉**

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないこと。
- (3) 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。
- (4) 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
- (5) 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (6) 目に入らないように注意すること。  
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。  
なお、症状が重い場合には、直ちに眼科医の診療を受けること。
- (7) 外用にのみ使用し、内服しないこと。

**【成分及び分量】**

エタノール76.9～81.4vol%を含む。

**【保管及び取扱い上の注意】**

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。



日本薬局方 第3類医薬品

# 400 消毒用エタノール

(販売名) 消毒用エタノール (サラヤ)

(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

300

- (4) 取扱う場合、換気を十分行うこと。
- (5) 火気に近づけないこと。
- (6) 使用期限が過ぎた製品は、使用しないこと。
- (7) 本剤はアルコールを含有しているため、床などの塗装面や衣服などについたりすると変色する場合がありますので注意すること。

**【お問い合わせ先】**

サラヤ株式会社 お客様相談窓口  
TEL.06-6797-2525

200

受付時間 9:00～18:00 (土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

**ゴミ73%削減 減容ボトル**

**1** ボトルの真ん中を両手で持ちつぶす。

**2** しっかりと押さえ込んだ後、空気が入らないようにキャップをしめ、廃棄する。



100

製造番号：底面記載  
使用期限：底面記載  
MADE IN JAPAN



ボトル：PE  
キャップ：PP  
ラベル：PE